



***Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden***  
***- Leicht gemacht -***



# Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden

	Wiesen-Kerbel	Giersch	Schafgarbe	Wilde Möhre
Blüten	Weißer Doldenblüte (8 bis 16 Einzeldolden)	Weißer Doldenblüte (15 bis 25 Einzeldolden)	Weißer / Rosa Scheindolde (viele Einzelblüten)	Weißer Doldenblüte mit violetter Einzelblüte
Höhe	60 bis 150 cm	30 bis 90 cm	10 bis 150 cm	20 bis 120 cm
Wuchsform	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende Pflanze mit niedrigen Blättern	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze
Stängel	im Inneren hohl, deutlich gefurcht	im Inneren hohl, dreieckig	harter - runder Stängel, leicht behaart	Runder Stängel, deutlich behaart
Blätter	Zwei bis dreifach gefiedert, länglicher Stiel	Länglicher Stiel, doppelt dreizählig, verkehrt eiförmig, spitz zulaufend	Sehr fein gefiedert / längliche Blätter	Zwei bis vierfach gefiedert
Duft / Geruch	Deutlich nach Kerbel	Möhre / Petersilie	Aromatischer Duft	Möhrenartig
Blütezeit	Mai bis Juli	Juni bis August	Juni bis September	Mai bis September

# Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden

	Bärwurz	Alpen-Mutterwurz	Wald-Engelwurz	Wiesen-Bärenklau
Blüten	Weißer Doldenblüte (6 bis 15 Einzeldolden)	Weißer bis rosa Doldenblüte (7 bis 10 [selten 15] Doppeldolden)	Weißer Doldenblüte (20 bis 40 Einzeldolden)	Weißer Doldenblüte (15 bis 30 Einzeldolden)
Höhe	20 bis 60 cm	10 bis 50 cm	50 bis 200 cm	100 bis 150 cm
Wuchsform	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze
Stängel	Grünlich gefärbt	Grünlich gefärbt	Dunkelpurpur / teilweise hellgrün gefärbt	rau, kantig gefurcht, grünlich gefärbt
Blätter	länglich mit vielen Fiederblättern	dreieckig mit vielen einzelnen kleinen Fiederblättern	zwei- bis vierfach gefiedert	Zwei bis vierfach gefiedert, dreieckige Form
Duft / Geruch	Würzig, aromatisch bei Anschnitt (ähnlich zu Fenchel)	Aromatischer Duft (bleibt bei Trocknung erhalten)	möhrenartiger Geruch	Unangenehmer Geruch beim Anschneiden
Blütezeit	Mai bis Juni	Juni bis August	Mai bis August	Juni bis Oktober

# Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden

	Hundspetersilie	Gefleckter Schierling (hoch giftig!)	Gold- Kälberkopf	Behaarter Kälberkopf
Blüten	Weißer Doldenblüte (15 bis 30 Einzeldolden)	Weißer Doldenblüte (8 bis 20 Einzeldolden)	Weißer Doldenblüte (10 bis 15 Einzeldolden)	Weißer Doldenblüte (10 bis 20 Einzeldolden)
Höhe	10 bis 100 cm	80 bis 180 cm	80 bis 120 cm	20 bis 120 cm
Wuchsform	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze
Stängel	Im inneren hohl, feine Streifung grünlich gefärbt	Im unteren Teil rot gefleckt	Im oberen Teil geteilt, zum Teil rot gefleckt	Grünlich gefärbt, abstehend behaart
Blätter	Zwei bis dreifach gefiedert, dreieckige Form, Unterseite glänzend	Zwei bis vierfach gefiedert, dreieckige Form	Zwei bis dreifach gefiedert, dreieckige Form	Dreifach gefiedert, dreieckige Form
Duft / Geruch	Unangenehmer Geruch beim Anschneiden	bei Anschnitt: deutlicher Geruch nach Mäuseurin (Vorsicht vor dem Saft!)	- Pflanzlich -	- Pflanzlich -
Blütezeit	Juni bis September	Juni bis September	Juni bis August	Mai bis Juli



## Wiesen- Kerbel

*Anthriscus  
sylvestris*

Essbares  
Wildgemüse





## Wiesen- Kerbel

*Anthriscus  
sylvestris*

Essbares  
Wildgemüse





## **Giersch**

*Aegopodium  
podagraria*

Essbares  
Wildgemüse



# Schafgarbe

*Achillea millefolium*

Teilweise  
essbares  
Wildgemüse



Essbares  
Wildgemüse



*Daucus carota*  
*subsp. carota*



**Wilde Möhre**






## Wilde Möhre

*Daucus carota subsp. carota*

Essbares Wildgemüse





## Bärwurz

*Meum  
athamanticum*

Heilpflanze





## Alpen- Mutterwurz

*Mutellina  
adonidifolia*

Seltenes  
essbares  
Wildgemüse





## Wald-Engelwurz

*Angelica sylvestris*

Heilpflanze





**Wald-Engelwurz**

*Angelica  
sylvestris*



p  
o  
t  
e  
n  
t  
i  
e  
l  
l  
g  
i  
f  
t  
i  
g



**Wiesen-Bärenklau**

*Heracleum  
sphondylium*



p  
o  
t  
e  
n  
t  
i  
e  
l  
l

g  
i  
f  
t  
i  
g



Kontakt mit den Pflanzenteilen  
kann Hautreizungen auslösen



**Wiesen-Bärenklau**

*Heracleum  
sphondylium*





## Gold-Kälberkropf

*Chaerophyllum aureum*

- ungiftig -



# Behaarter Kälberkropf

*Chaerophyllum  
hirsutum*

- Ungiftig -





Vor allem für Tiere bei Verzehr giftig! Größere Mengen tödlich!



**Hundspetersilie** *Aethusa cynapium*

