Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden

- Leicht gemacht -

© blumen-natur.de

Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden

	Wiesen-Kerbel	Giersch	Schafgarbe	Wilde Möhre
Blüten	Weiße Doldenblüte (8 bis 16 Einzeldolden)	Weiße Doldenblüte (15 bis 25 Einzeldolden)	Weiße / Rosa Scheindolde (viele Einzelblüten)	Weiße Doldenblüte mit violetter Einzelblüte
Höhe	60 bis 150 cm	30 bis 90 cm	10 bis 150 cm	20 bis 120 cm
Wuchsform	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende Pflanze mit niedrigen Blättern	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze
Stängel	im Inneren hohl, deutlich gefurcht	im Inneren hohl, dreieckig	harter - runder Stängel, leicht behaart	Runder Stängel, deutlich behaart
Blätter	Zwei bis dreifach gefiedert, länglicher Stiel	Länglicher Stiel, doppelt dreizählig, verkehrt eiförmig, spitz zulaufend	Sehr fein gefiedert / längliche Blätter	Zwei bis vierfach gefiedert
Duft / Geruch	Deutlich nach Kerbel	Möhre / Petersilie	Aromatischer Duft	Möhrenartig
Blütezeit	Mai bis Juli	Juni bis August	Juni bis September	Mai bis September

Doldenblütler & Schafgarben unterscheiden

	Wiesen-Bärenklau	Bärwurz	Gold-Kälberkropf	Behaarter Kälberkopf	Gefleckter Schierling (hoch giftig!)
Blüten	Weiße Doldenblüte (15 bis 30 Einzeldolden)	Weiße Doldenblüte (6 bis 15 Einzeldolden)	Weiße Doldenblüte (10 bis 15 Einzeldolden)	Weiße Doldenblüte (10 bis 20 Einzeldolden)	Weiße Doldenblüte (8 bis 20 Einzeldolden)
Höhe	100 bis 150 cm	20 bis 60 cm	80 bis 120 cm	20 bis 120 cm	80 bis 180 cm
Wuchsform	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze	Aufrecht wachsende, krautige Pflanze
Stängel	rau, kantig gefurcht, grünlich gefärbt	Grünlich gefärbt	Im oberen Teil geteilt, zum Teil rot gefleckt	Grünlich gefärbt, abstehend behaart	Im unteren Teil rot gefleckt
Blätter	Zwei bis vierfach gefiedert, dreieckige Form	länglich mit vielen Fiederblättern	Zwei bis dreifach gefiedert, dreieckige Form	Dreifach gefiedert, dreieckige Form	Zwei bis vierfach gefiedert, dreieckige Form
Duft / Geruch	Unangenehmer Geruch beim Anschneiden	Würzig, aromatisch bei Anschnitt (ähnlich zu Fenchel)	- Pflanzlich -	- Pflanzlich -	bei Anschnitt: deutlicher Geruch nach Mäuseurin (Vorsicht vor dem Saft!)
Blütezeit	Juni bis Oktober	Mai bis Juni	Juni bis August	Mai bis Juli	Juni bis September

Wiesen-Kerbel

Anthriscus sylvestris

Essbares Wildgemüse



Wiesen-Kerbel

Anthriscus sylvestris

Essbares Wildgemüse

Giersch

Aegopodium podagraria

Essbares Wildgemüse

Schaf-garbe

Achillea millefolium

Teilweise essbares Wildgemüse

Essbares
Wildgemüse

Wilde Möhre

Daucus carota
subsp. carota

Wilde Möhre

Daucus carota subsp. carota

Essbares Wildgemüse

potentiell giftig

Wiesen-Bärenklau

Heracleum sphondylium

potentiell giftig

Kontakt mit den Pflanzenteilen
kann Hautreizungen auslösen

Wiesen-Bärenklau

Heracleum sphondylium



Bärwurz

Meum athamanticum

Heilpflanze

Gold-Kälberkropf

Chaerophyllum aureum

- ungiftig -

Behaarter Kälberkropf

Chaerophyllum hirsutum

- Ungiftig -